

Odchov selat od narození do odstavu

Porodní ošetření selat:

- 1) vyčištění a zprůchodnění dých. cest
- 2) osušení
- 3) pupeční šňůru (vyčistit, ustříhnout, dezinfikovat)
- 4) uložit do tepla asi 30-32 °C (zatím nemá vyvinutou termoregulaci)
- 5) po ukončení porodu přiložit k mléčným žlázám

Odchov selat:

- po narození se selata musí vyrovnat s mnoha problémy
- selata nejsou dostatečně připravena na odlišné prostředí:
 - *bez imunity
 - *nemají vyvinutou termoregulaci
 - *mají anemii (chudokrevnost)
 - *nedostatečně vyvinutý trávicí trakt

Výživa a krmení:

- prvním krmivem je mlezivo (2-3 dny) – mlezivo musí dostat co nejdříve jinak nastane
anemie (chudokrevnost) = je stav, při kterém je v krvi nedostatek červených krvinek nebo hemoglobinu (červeného krevního barviva v krvinkách, které přenášejí kyslík) a vyplácí se prevence a to očkováním.
- pak po mlezivu nastupuje mateřské mléko které selatům dlouho nevydrží (14dní). Proto
v době mezi 5-10 dnem začínáme přikrmovat jadrnými krmivy a to buď ve formě KKS nebo šroty obilovin.
- přikrmujeme tak, aby sele v době odstavu(50dnech) spotřebovalo takové množství krmiva,
aby mu stačilo po odstavu.

Ustájení selat:

- 1) V porodně - vedle kotce je to oddělený prostor
 - musíme dávat více krmiva
 - vyšší teplota (vytápění podlahové)
 - v kotci nehrozí přilehnutí od prasnice
 - stupeň vyhřívání je 30° - 32°C a ve stáří 1 měsíce kolem 21°C
- 2) V odchovnách - jsou zde ustájena od odstavu do 30kg (2-3 měsíců se dosáhne 30kg)
 - rozřídí se a jdou do výkrmu nebo do chovu (prasničky)
 - prasata v odchovnách se jmenují odstávčata
 - selata jsou ve skupinových kotcích
 - ve velkých odchovnách jsou odchovny udělány do pater

Ošetřování selat:

- musí být dodržena zoohygiena a výživa
- 1) příkládání selat - příkládáme k prasnici aby mohla sát
 - selata při sání jsi vytvoří určité pořadí a to pak dodržují
 - při prvním sání vybrat menší selata a dát je k předním strukům,
silnější dít více do zadu.
- 2) kupírování ocasu – má omezit ohryzávání ocásků = kanibalismus
 - jen tam kde jsem projevuje kanibalismus
 - provést 24 hodin po narození
- 3) kastrování kanečků - protože jse jim začínají tvořit pohlavní hormony

- kastrují se aby bylo dobré maso
- kastrujeme po narození a to nejčastěji v 1 měsíci
- 4) štípání špičáků - usměrněno zákonem na ochranu zvířat
- pouze tehdy kdy dochází k poškození mléčné žlázy u prasnice a to při prvních poranění.

Odstav selat:

- pouze když máme předpoklad že dovedou přijímat jinou potravu
- provádí se jednorázově
- může být: 1) tradiční odstav - v drobnochovech
 - ve věku 2 měsíců při 15 kg
 - umožňují delší dobu sát mléko
 - prodlužuje se délka mezidobý
- 2) časný odstav - provádí se po 30 dnech při 8 - 10 kg
 - předpoklad příjmu krmiv by měl být 0,15kg/den
 - kratší doba mezidobý tím pádem je vyšší počet porodů
 - vyrovnaný vrh selat (selata jsou nucena přijímat více jaderných krmiv)