

PÍCNINY

Význam

- výživa
hospodářských zvířat
 - přímé zkrmování
 - konzervace -
silážování,
senážování, sušení
- zlepšující plodiny



1. JEDNOLETÉ PÍCNINY

1. K plynulému zásobování zvířat čerstvou pící
 - OZIMÉ (zejména luskovinoobilní směsky)
 - JARNÍ (např. ječmen, oves)
 - LETNÍ/STRNISKOVÉ (kukuřice, slunečnice, hořčice, obilniny)
2. Ke konzervaci
 - silážní kukuřice
 - senážní oves

2. VÍCELETÉ PÍCNINY

- společně se silážní kukuřicí jsou nejpodstatnější složkou krmiva pro chov skotu
- řadí se sem jeteloviny, jetelovinotravní směsky a trávy

a. Jeteloviny

- neutrální pH půdy
- hlízkové bakterie na kořenech
- Na kořenovém krčku se tvoří pupeny, které jsou základem odnoží
- na poli se pěstují se po obilnině (= krycí plodina; např. oves), do které se často vysévají jako podsev



Vojtěška setá

Jetel luční





Vojtěška setá

- suchovzdorná plodina, pěstuje se v nižších polohách
- hluboké kořeny (nevyhovující je vysoká hladina podzemní vody)
- odolná vymrzání
- náročnější na půdní podmínky (živiny, zásadité pH)



Jetel luční

- náročnější na vodu, pěstuje se ve vyšších polohách
- méně hluboké kořeny
- náchylnější k vymrzání

Sklizeň



VOJTĚŠKA

- vytrvalost porostu:
 - 3-5 let
- počet sečí za rok:
 - 2-3
- sklizeň před vykvetením



JETEL

- vytrvalost:
 - 2-4 roky
- počet sečí za rok:
 - 3-4
- sklizeň těsně po vykvetení

b. Trávy

- louky (několik sečí ročně) a pastviny (přímé spásání)



C. Jetelovinotravní směsky

- Vysévají se také buď jako podsev do krycí plodiny nebo se pěstují bez krycí plodiny
- 2-3 seče za rok